

## НОВЫЕ ТАКСОНЫ В АРАХНОФАУНЕ КРЫМА

**Апостолов Л. Г., доктор естественных наук, профессор**

**Ончурев М. В., аспирант**

Пауки на территории Крымского полуострова изучены крайне недостаточно. Специальная инвентаризация арахнофауны данного региона проводилась единственный раз С.А.Спасским в 1927 году [1].

Предлагаемая работа включает в себя список, являющийся результатом обработки довольно большой коллекции пауков Естественно-Исторического Музея Таврического Губернского Земства, полученной Спасским в 1914 году от С.Мокржецкого; кроме того, профессором были использованы: небольшая коллекция, присланная А.П.Брагиной – видным деятелем в арахнологии того времени, сборы сделанные Н.М.Спасской, главным образом в окрестностях Ялты, а также сборы студентов Донского института Сельского Хозяйства и Мелиорации.

Такая неизученность арахнофауны полуострова послужила поводом для проведения ревизии отряда в настоящее время. При исследовании в любом районе мы стремились собрать возможно более полный коллекционный материал.

С 1994 года по 1997 год нами было собрано более 3000 экземпляров пауков. При обработке материала пользовались "Определителем пауков европейской части СССР" В.П.Тышленко [2], "Определителем пауков Донской области" С.А.Спасского [3], "Кратким определителем пауков (Aranei) лесной и лесостепной зоны СССР" Н.С.Ажегановой [4], "Определителем пауков семейства Linyphiidae Кавказа" А.В.Танасевича [5].

В ходе установления видовой принадлежности было выяснено, что пауки в нашей коллекции относятся к 26-и семействам, 77-и родам, 153-м видам. Самыми многочисленными семействами оказались: сем. Araneidae – 12 родов, 30 видов пауков; сем. Theridiidae – 6 родов, 11 видов /из которых один вид не определен (sp.)/; сем. Lycosidae – 4 рода, 26 видов; сем. Thomisidae – 8 родов, 12 видов пауков; сем. Salticidae – 11 родов, 16 видов. Основываясь на каталогах Спасского С.А. [1], Харитонова Д.Е. и дополнении к нему [6, 7], на каталоге пауков мира Нормана Платника [8] и каталоге Михайлова К.Г. мы видели 3 рода и 31 вид новых для фауны Крымского полуострова, которые относятся к 12-и семействам.

сем. Theridiidae

1. *Enoplagnatha crucifera* (Thor.,1875), 1 г. Джанкой, 1 г. Симферополь;
2. *Steatoda grossa* (C.L.Koch,1838), 6 2 3 juv г. Симферополь;
3. *Theridion mystaceum* (C.K.Koch,1870), 1 г. Карадаг.

сем. *Tetragnathidae*

4. *Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1758), 2 Симферопольское вдхрн.

сем. *Lycosidae*

5. *Alopecosa accentuata* (Latr., 1817), 1 Донузлав, 1 г. Симферополь, 1 Кизил-Коба;  
6. *A.pentheri* (Nosek, 1905), 1 Карадаг;  
7. *Pardosa alacris* (C.L.Koch, 1833), 1 г. Симферополь;  
8. *P.bifasciata* (C.L.Koch, 1834), 1 Донузлав, 1 г. Джанкой, 2 м. Сарыч;  
9. *P.scoparia* (Simon, 1876), 1 г. Симферополь, 2 Джанкой.

сем. *Dictynidae*

10. *Devade indistincta* (O.P.-Cambr., 1872), 2 с. Николаевка.

сем. *Agelenidae*

11. *Cedicus* sp. /новый для фауны Крыма род/, 2 Загорское вдхрн.  
12. *Oxyopes ramosus* (Mart et Goeze, 1778), 1 Донузлав, 1 м. Сарыч.

сем. *Liocranidae*

13. *Agroeca dentigera* (Kulczynski, 1913), 2 ст. Прибрежная Саки;  
14. *A.lusatica* (C.L.Koch, 1875), 1 с. Калиновка п-в Казантип.

сем. *Clubionidae*

15. *Cluiona corticalis* (Walck, 1802), 2 г. Джанкой;  
16. *C.caerulescens* (C.L.Koch, 1866), 1 г. Симферополь, 1 г. Джанкой.

сем. *Zodariidae*

17. *Zodarion germanicum* (C.L.Koch, 1837), 1 Симферопольское вдхрн.

сем. *Gnaphosidae*

18. *Haplodrassus dalmatensis* (C.L.Koch, 1866), 1 Херсонес, 1 Симферопольское вдхрн  
19. *Zelotes acneus* (Simon, 1878), 1 с. Васильевка Ялта;  
20. *Z.petrensis* (C.L.Koch, 1839), 1 juv ст. Прибрежная Саки.

сем. *Philodromidae*

21. *Philodromus praedatus* (O.P.-Cambr., 1871), 1 ЯГАЗ, 1 с. Краснолесье.

сем. Thomisidae

22. *Heriaeus oblongus* (Simon, 1918), 1 г. Симферополь, 11 м. Сарыч;
23. *Xysticus luctuosus* (Blackw., 1836), 2 г. Симферополь;
24. *X.ulmi* (Hahn, 1831), 2 с. Желябовка Нижнегорского р-на;
25. *X.robustus* (Hahn, 1831), 22 г. Джанкой.

сем. Salticidae

26. *Evarcha lactabunda* (C.L.Koch, 1847), 21 м. Сарыч, 3 ст. Прибрежная Саки;
27. *E.flammata* (Gerck, 1757), 1 с. Желябовка, 2 г. Симферополь;
28. *Heliophanus flavipes* (Hahn, 1832), 1 Вдхрн. на р. Зуя;
29. *H.lineiventris* (Simon, 1868), 1 Между гор. Онук и с. Яковенково;
30. *Myrmarachne joblotii* (Scop, 1763) /новый род/, 1 г. Симферополь, 31 Донузлав;
31. *Synageles hilaricus* (C.L.Koch, 1846) /новый род/, 11 г. Симферополь, 31 Донузлав.

В результате проведенных исследований выяснено, что арахнофауна Крымского региона представлена 153-мя видами, относящимися к 26-и семействам. По территории Крыма пауки распределены неравномерно. Каждому физико-географическому району характерен свой комплекс видов: в Присивашье – 58 видов, на Тарханкутском плато – 20, на Центральной степной равнине – 23, на Керченском полуострове – 25, в Предгорьях – 109, на Главной гряде – 12 и на ЮБК – 55 видов пауков. Важным итогом работы является тот факт, что на территории полуострова зарегистрирован 31 новый для его фауны вид пауков, относящихся к 12 семействам. Обнаружены также 3 новых для фауны Крыма рода: *Cedicus* Simon, 1875 (Agelenidae); *Myrmarachne* Mac leay, 1839 (Salticidae); *Synageles* Simon, 1876 (Salticidae).

#### Литература.

1. Спасский С.А. Материалы к фауне пауков Таврической губернии. - Новочеркасск: Знание, 1927. - 15 с.
2. Тыщенко В.П. Определитель пауков Европейской части СССР. - Л.: Наука, 1971. - 281 с.
3. Спасский С.А. Определитель пауков Донской области. -Новочеркасск: Знание, 1925. - 63 с.
4. Ажеганова Н.С. Краткий определитель пауков (Aranei) лесной и лесостепной зоны СССР.-Л.: Наука, 1968.-149 с.
5. Танасевич А.В. Определитель пауков семейства Linyphiidae Кавказа//Фауна наземных беспозвоночных Кавказа, 1990.-М.: Наука, -С.76-114.
6. Харитонов Д. Е. Каталог русских пауков. -Л.: изд. АН СССР, 1932.-206 с.
7. Харитонов Д. Е. Дополнение к каталогу русских пауков//Ученые записки. - Пермь, 1936. - Т. 2, вып. 1. - С. 167-225.

8. Platnic N. I. Advanced in spider taxonomy 1988-1991. Ed. by P. Merreft Manchester, New York: Manchester University. -1993. - 846 p.
9. Дунин П. М. Пауки семейства Dysderidae фауны Кавказа (Arachnida Aranei Haplogynae)//*Arthropoda selecta*. - М. 1992. - Т.1, вып. 3. - С. 35-76.
10. Михайлов К. Г. Пауки рода Clubiona Latr., 1804 (Arachnida Aranei Clubionidae) фауны СССР: критический обзор с таксономическими замечаниями//*Arthropoda selecta*. - М. 1992. - Т.1, вып. 3. - С. 3-34.