

УДК 577.322 : 537.632.5

Мартынюк В.С., Калиновский П.С., Цейслер Ю.В.

## ВЛИЯНИЕ СЛАБОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ КРАЙНЕ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИТОХРОМА С В ПРИСУТСТВИИ ХЛОРОФОРМА

### ВВЕДЕНИЕ

Согласно современным представлениям первичные механизмы воздействия ПеМП реализуются на уровне структурных перестроек молекулярных ассоциатов воды [1], которые могут играть важную роль в динамическом поведении и функционировании биополимеров [2].

Показано, что в воде и водных растворах имеет место возникновение пространственно-временного порядка за счет сил дальнодействия, который может быть изменен или разрушен слабыми воздействиями [3]. Предполагается, что изменение структурно-динамических свойств водной фазы может приводить к изменению гидрофильно-гидрофобного баланса в коллоидных системах [4]. Подтверждением этого предположения следует рассматривать данные об изменении оптических свойств растворов глицилтриптофана [4], а также растворимости бензола и ретинолацетата в воде и водных растворах альбумина [5,6].

В связи с этим целью настоящего исследования была оценка влияния ПеМП на спектральные характеристики цитохрома с, вызванных взаимодействием раствора белка с агентом гидрофобной природы – хлороформом.

### МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящем исследовании, так же как и предыдущих работах [5,6], в качестве базовой модели гидрофобных взаимодействий было использовано явление насыщения растворов белка низкомолекулярными углеводородами и их галогенпроизводными гидрофобной природы [7]. Насыщение 0.05 %-ных растворов цитохрома с хлороформом осуществляли путем насыщения 3 мл раствора белка на 1.5 мл хлороформа с последующей инкубацией образцов при комнатной температуре 22-24°C. Лиофильный электрофоретически чистый препарат цитохрома с (окисленная форма) был любезно предоставлен научно-производственной компанией «Биоритм» (Украина). Водные растворы цитохрома с характеризовались максимумом поглощения полосы Соре 408-409 нм. По окончании установленного срока инкубации регистрировали дифференциальные спектры растворов цитохрома с, насыщенных хлороформом, против растворов данного белка, находящихся в тех же условиях без добавления хлороформа.

Для моделирования окислительно-восстановительных процессов, протекающих с участием цитохрома с использовали реакцию восстановления белка раствором

аскорбиновой кислоты в конечной концентрации 0,11 мМ/л. К 1,5 мл 0,05% раствора *цитохрома с* добавляли 0,2 мл 1 мМ раствора аскорбиновой кислоты pH=7.0. Перед измерением активности растворы *цитохрома с* в объеме 1,5 мл инкубировали с 0,5 мл хлороформом в течение 1, 2 и 3 часов при температуре 20-23°C. Активность фермента оценивали по изменению оптической плотности при длине волны  $\lambda=550$  нм.

Импульсное магнитное поле создавали кольцами Гельмгольца. Импульсы были прямоугольной формы и разной полярности. Частота магнитного поля составляла 8 Гц, индукция 25  $\mu$ T. Вектор индукции создаваемого магнитного поля был параллельным вектору геомагнитного поля. Опытные образцы помещали в кольца Гельмгольца. Контрольные пробы находились в условиях фоновых значений ПемП, характерных для данной лаборатории (20-65 нТ). Для оценки возможного влияния различий в уровне фоновых ЭМП в местах расположения опытных и контрольных образцов проводили эксперименты с ложным воздействием МП. В этом случае опытные образцы помещали в кольца Гельмгольца, но не подвергали воздействию МП.

Для оценки достоверности влияния МП КНЧ использовали t-критерий Стьюдента.

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рисунке 1 представлены дифференциальные спектры раствора *цитохрома с*. Как видно при его насыщении хлороформом спектр поглощения претерпевает «голубой сдвиг». Согласно [8] это свидетельствует об увеличении полярности среды, окружающей хромофор. В данном эксперименте увеличение полярности среды может быть вызвано двумя причинами, которые не исключают друг друга и могут реализоваться одновременно.

В первом случае «голубой сдвиг» может быть вызван большей доступностью молекул воды к хромофору (гему). Учитывая, что в нативном *цитохроме с* гем почти полностью погружен в гидрофобную полость белковой глобулы и практически недоступен полярному растворителю, «голубой сдвиг» можно интерпретировать как свидетельство частичной денатурации белка, вызванной связыванием хлороформа, и экспонирования хромофора (гема) к полярному растворителю – воде.

Во втором случае, «голубой сдвиг» может быть вызван связыванием молекул хлороформа с гидрофобными полостями *цитохрома с*. Несмотря на то, что хлороформ относят к группе неполярных веществ, молекула данного вещества характеризуется достаточно высоким для неполярных веществ дипольным моментом  $\mu_{\text{хлороформ}}=1.06$  D (для сравнения  $\mu_{\text{вода}}=1.84$  D,  $\mu_{\text{бензол}} \approx \mu_{\text{гептан}} \approx 0$  D). Это свойство молекул хлороформа, заполняющих гидрофобные полости белка, также может вносить существенный вклад в формирование наблюдаемого в эксперименте «голубого сдвига». Согласно [7], связывание углеводородов в гидрофобных полостях молекул белков, растворенных в воде не приводит к существенным конформационным изменениям. В связи с этим наиболее обоснованным, является предположение о том, что наблюдаемый «голубой сдвиг» происходит в результате заполнения гидрофобных полостей *цитохрома с* слабополярными молекулами




Рис. 1 Интегральный (1, левая шкала) и дифференциальные (2-4, правая шкала) спектры 0.05% растворов цитохрома с через 2 (2), 4 (3) и 24 (4) часа инкубации с хлороформом.

**Табл. 1. Основные характеристики дифференциальных спектров цитохрома с**

Время экспозиции (ч)	Параметр	Контрольные образцы (нм)	Ложное воздействие (нм)	Магнитное поле (нм)	Изменение относительно контрольных образцов (%)	Изменение относительно ложного воздействия (%)
2	$\lambda_{\max}$	$397,3 \pm 1,9$	$394,0 \pm 3,8$	$387,8 \pm 5,0^*$	-2,9	-1,6
4	$\lambda_{\max}$	$391,5 \pm 3,0$	$398,8 \pm 1,6$	$390,3 \pm 4,3^{**}$	-0,6	-2,1
24	$\lambda_{\max}$	$393,2 \pm 1,8$	$395,8 \pm 2,2$	$391,0 \pm 5,1$	-1,1	-1,2
2	$\lambda_{\min}$	$413,9 \pm 0,5$	$415,0 \pm 1,3$	$413,0 \pm 0,9$	-0,2	-0,5
4	$\lambda_{\min}$	$412,7 \pm 0,7$	$414,3 \pm 2,6$	$413,9 \pm 0,7$	0,3	-0,1
24	$\lambda_{\min}$	$414,4 \pm 0,4$	$415,2 \pm 0,4$	$415,0 \pm 1,0$	0,0	0,0
2	$\lambda_{\min}-\lambda_{\max}$	$16,7 \pm 1,7$	$21,0 \pm 3,4$	$25,2 \pm 4,3^*$	76,2	20
4	$\lambda_{\min}-\lambda_{\max}$	$21,3 \pm 2,9$	$15,5 \pm 2,9$	$23,6 \pm 3,7^{**}$	24,0	52,3
24	$\lambda_{\min}-\lambda_{\max}$	$21,2 \pm 1,9$	$19,4 \pm 2,4$	$24,0 \pm 4,1$	32,7	23,7
2	$D_{\max}-D_{\min}$	$34,0 \pm 2,4$	$38,3 \pm 7,1$	$38,3 \pm 5,8$	12,6	0,0
4	$D_{\max}-D_{\min}$	$32,1 \pm 2,7$	$34,5 \pm 4,2$	$33,0 \pm 3,0$	2,8	-4,4
24	$D_{\max}-D_{\min}$	$46,3 \pm 2,8$	$45,6 \pm 3,9$	$54,8 \pm 1,6^{***}$	18,3	20,1

*Примечание:* \* - достоверные различия относительно контрольных образцов; \*\* - достоверные различия относительно ложной экспозиции.

хлороформа, которые в дополнение к этому оказывают частичное денатурирующее действие и открывают доступ гема к воде.

Следует обратить внимание, что процесс насыщения раствора цитохрома *c* характеризуется определенной динамикой в дифференциальных спектрах (рис. 1). По мере насыщения белка хлороформом максимум дифференциального спектра ( $\lambda_{\max}$ ) смещается в более коротковолновую область, тогда как положение минимума ( $\lambda_{\min}$ ) почти не изменяется. Этот процесс сопровождается также небольшим гипохромным эффектом.

Анализ дифференциальных спектров показал, что влияние импульсного магнитного поля наиболее ярко выражено в первые часы процесса насыщения растворов цитохрома *c* хлороформом. В частности, данный фактор ускоряет формирование «голубого сдвига» (табл. 1) При этом наиболее чувствительным элементом к действию магнитного поля является спектральный максимум, который претерпевает смещение в «голубую» область, а также разность длин волн  $\lambda_{\min}-\lambda_{\max}$  (табл 1).

При длительной суточной экспозиции растворов цитохрома *c* в магнитном поле в дифференциальном спектре также зарегистрировано достоверное увеличение параметра  $D_{\max}-D_{\min}$  (табл. 1), который согласно [9] характеризует количество связанного лиганда.




Рис. 2. Влияние переменного магнитного поля на активность цитохрома *c* насыщаемого хлороформом в % по отношению к контрольным образцам, не насыщаемых хлороформом, (левый рисунок – эксперимент с магнитным полем; правый рисунок – эксперимент с ложным воздействием; линия 1 – влияние хлороформа; линия 2 – одновременное влияние хлороформа и переменного магнитного поля; линия «100%» - контроль; \*, \*\* – достоверное влияние магнитного поля относительно контрольных и насыщенных хлороформом образцов цитохрома *c*).

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что слабое импульсное магнитное поле крайне низких частот усиливает процесс связывания хлороформа с гидрофобными полостями белка. Это является дополнительным подтверждением представлений о том, что в основе биологического действия слабых переменных магнитных полей лежит изменение гидрофильно-гидрофобного баланса в водных растворах биополимеров и поверхностно-активных веществ.

Как известно, низкомолекулярные органические растворители, в том числе и хлороформ, являются мощными денатурирующими агентами. Возникает естественный вопрос о влиянии связывающегося хлороформа на функциональную активность цитохрома *c*. Для внесения ясности в данную проблему были проведены исследования каталитической активности цитохрома *c* в условиях его насыщения хлороформом и воздействия переменным магнитным полем. Как видно (рис. 2) ингибирующее действие хлороформа в исследуемой модельной системе проявляется относительно слабо и, как правило, достоверно выявляется через 2 часа инкубации, а снижение ферментативной активности не превышает 10 %. Это указывает на то, что насыщение белка хлороформом в «мягких» условиях не приводит к значительным конформационным перестройкам и, соответственно, не приводит к полной потери активности изучаемого фермента.

Полученные результаты в экспериментах с магнитным полем (рис. 2) показывают, что ускорение связывания хлороформа цитохромом *c*, вызванное действием физического фактора, приводит к достоверному снижению активности фермента в первый час эксперимента на 15-20%. Данный факт свидетельствует о том, что переменное магнитное поле стимулирует связывание хлороформа цитохромом *c* и тем самым усиливает денатурирующее действие неполярного растворителя на нативную структуру белка.

## **ВЫВОДЫ**

1. Насыщение водного раствора цитохрома *c* хлороформом сопровождается формированием «голубого сдвига» в спектре поглощения гема, что указывает на связывание хлороформа данным белком.
2. Связывание хлороформа цитохромом *c* не приводит к существенной потере активности фермента, что свидетельствует о сохранении нативной конформации данного белка.
3. Переменное магнитное поле ускоряет формирование «голубого сдвига» в области полосы Соре в спектре цитохрома *c*, что указывает на ускорение связывания хлороформа белком.
4. Переменное магнитное поле, ускоряя процесс насыщения цитохрома *c* хлороформом, приводит к достоверному снижению активности фермента на 15-20% в первые часы инкубации и тем самым усиливает денатурирующее действие неполярного растворителя.

5. Изменение белковых характеристик при комбинированном действии хлороформа и ЭМП зависит от времени воздействия, что свидетельствует о динамичности конформационных перестроек белка при действии возмущающих агентов.

### **Список литературы**

1. Слесарев В. И., Шабров А. В. Влияние структуры воды на её статические и динамические свойства. / Тезисы докладов 2-го Международного конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине», Санкт-Петербург 3-7 июля 2000. – Санкт Петербург, 2000. – С. 102 – 103.
2. Каяверянен Л. И. Динамическое поведение белков в водной среде и их функции. - Л.: Наука, 1980.-272 с.
3. Черников Ф.Р. Влияние некоторых физических факторов на колебания светорассеяния в воде и водных растворах биополимеров // Биофизика. – 1990. – Т. 35. – в. 5. – С. 711- 715.
4. Лобышев В.И., Рыжиков Б.Д., Шихлинская Р.Э. Спонтанные и индуцированные внешними электромагнитными полями долговременные переходные процессы в разбавленных водных растворах глицерилтриглицерина и воде // Биофизика. – 1998. – Т. 43. – в. 4. – С. 710 - 715.
5. Мартынюк В.С., Шадрина О.Г. Влияние переменного магнитного поля крайне низкой частоты на растворимость бензола в воде и растворах белка // Биомедицинская радиоэлектроника. – 1999. - № 2. – С. 56-60.
6. Калиновский П. С., Мартынюк В. С. Действие переменных магнитных полей на связывание гидрофобных лигандов сывороточным альбумином // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского сер. «Биология» - 2000. - т. 14. - №2. С. 89-93.
7. Измайлова В.Н., Ребиндер П.А. Структурообразование в белковых системах. - М.:Наука, 1974. - 286с.
8. Демченко А.П. Ультрафиолетовая спектрофотометрия и структура белков. – Киев:Наукова думка, 1981. – 208 с.
9. Ахрем А.А., Тищенко Е.И., Киселев П.А., Метелица Д.И. Спектральные характеристики взаимодействия цитохрома с и гемоглобина с метанололом и анилином // Биохимия. – 1978. – Т. 43. - в. 11. – С. 2033-2037.

Статья поступила в редакцию 08.01.2001